

CADERNO DE PROVA

ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:

- 1- CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA.
- 2- ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA.
- 3- CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE HOUVER QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A SEQUÊNCIA DE QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA.
- 4- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA.
- 5- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À INTERPRETAÇÃO DAS QUESTÕES.
- 6- NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ SUBSTITUÍDO.
- 7- ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
- 8- PASSE AS RESPOSTAS PARA O CARTÃO-RESPOSTA.
- 9- PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO-RESPOSTA.
- 10- SÓ ENTREGUE A PROVA APÓS TRANSCORRIDOS 30 (TRINTA) MINUTOS DO SEU INÍCIO.
- 11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE RETIRAR IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
- 12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE PROVAS.

BOA PROVA.



CATANDUVAS, 26 de janeiro de 2014.

LÍNGUA PORTUGUESA

1) Sobre as figuras de sintaxe, analise as afirmações a seguir:

I- Elipse: se caracteriza pela omissão de um termo na oração não expresso anteriormente, contudo, facilmente identificado pelo contexto.

II- Zeugma: ocorre a omissão de um termo já expresso no discurso.

III- Anáfora: se caracteriza pela repetição intencional de um termo no início de um período, frase ou verso.

Agora, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Todas as alternativas estão corretas;
- b) Somente a alternativa I está correta;
- c) Somente a alternativa II está correta;
- d) Somente a alternativa III está correta.

2) Sobre as regras de acentuação, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Paralelepípedo: leva acento, pois é uma paroxítona;
- b) Mortadela: não leva acento, pois é uma proparoxítona terminada em “a”;
- c) Número: leva acento, pois é uma palavra oxítona terminada em o;
- d) Cenário: leva acento, pois é uma palavra paroxítona terminada em ditongo.

3) Analise as alternativas e assinale a que contém ERRO de ortografia.

- a) Estranheza;
- b) Escasso;
- c) Massante;
- d) Paçoca.

4) Dentre as alternativas abaixo, qual palavra NÃO pode levar acento?

- a) Horário;
- b) Hostia;
- c) Dilapidar;
- d) Involucro.

5) Sobre os sinais de pontuação, analise as alternativas a seguir:

I- Ponto de exclamação: é utilizado, entre outras situações, depois de frases que expressem sentimentos distintos, tais como: entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror, espanto.

II- Ponto e vírgula: é usado quando se vai fazer uma citação ou introduzir uma fala.

III- Dois pontos: é usado para separar itens enumerados.

Agora, assinale a alternativa CORRETA

- a) Todas as alternativas estão corretas;
- b) Somente a alternativa I está correta;
- c) Somente a alternativa II está correta;
- d) Somente a alternativa III está correta.

6) Assinale a alternativa que contém um exemplo de verbo conjugado no pretérito mais-que-perfeito.

- a) Partires;
- b) Sorriu;
- c) Passará;
- d) Ligara.

7) Analise o parágrafo a seguir:

“Muitos alunos, ao terem os primeiros contatos com o Latim, se assustam ao verem tantas formas diferentes, tantas flexões.”

Agora, assinale a alternativa que apresenta o sujeito da frase:

- a) ao terem os primeiros contatos com o Latim;
- b) Muitos alunos;
- c) se assustam;
- d) ao terem os primeiros contatos com o Latim, se assustam ao verem tantas formas diferentes, tantas flexões.

8) Sobre a colocação pronominal, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Pouco se sabe sobre este caso.;
- b) Nunca soubemos quem amava-nos.;
- c) Que Deus acompanhe-te!;
- d) Me levantei assim que chamou-me ao telefone.

9) Analise o parágrafo a seguir:

O desafio no ensino de crianças e jovens é ensiná-los a mobilizar o conhecimento a serviço das pessoas e de seus próprios projetos e, ao mesmo tempo, reconhecê-lo não como um dado imutável e, sim, como resultado da ação humana [...]

Agora, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Desafio – crianças – jovens – como: são exemplos de substantivos;
- b) ensiná-los e reconhecê-los são exemplos de verbos;

- c) imutável e ação humana são exemplos de advérbios;
d) seus – não – ao: são exemplos de pronomes.

10) Analise as frases a seguir e assinale a alternativa que contém um exemplo de denotação.

- a) João Pedro é um anjo.;
b) José quebrou a cara de Marcelo.;
c) Eduarda tem o coração de ouro.;
d) Pietra é uma criança feliz.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) A região catarinense que possui a maior densidade demográfica é:

- a) Grande Florianópolis;
b) Vale do Itajaí;
c) Norte;
d) Oeste.

12) Assinale a alternativa que não corresponde a uma das três fontes de energia mais utilizadas no mundo:

- a) Petróleo;
b) Carvão Mineral;
c) Gás Natural;
d) Hidrelétrica.

13) A China não pode ser considerada um país desenvolvido devido a:

- a) Possuir a maior população do planeta;
b) Não possuir recursos naturais suficientes, dependendo da importação desses recursos;
c) Possuir muitas indústrias com sede em outros países;
d) Possuir grande desigualdade social e condições de vida ainda precárias para grande parcela da população.

14) O Programa Nacional do Alcool (Proálcool) criado em 14 de novembro de 1975, tinha como propósitos naquela época:

- a) Incentivar a produção de álcool para ser usado em larga escala como combustível veicular em substituição à gasolina;
b) Aumentar a produção de álcool para exportação;
c) Aumentar a produção de álcool afim de evitar as grandes quedas no preço do açúcar, já que

parte da cana produzida seria destinada à produção de álcool combustível;

d) Substituir completamente a gasolina para evitar a poluição do aquecimento global.

15) São características da Floresta Amazônica Brasileira, exceto:

- a) Possui espécies perenifólias;
b) É predominantemente xerófila;
c) É heterogênea;
d) É densa.

16) Assinale a alternativa que contém um país americano integrante da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo):

- a) Estados Unidos;
b) Venezuela;
c) Brasil;
d) Colômbia.

17) Balança comercial é a relação entre importações e exportações de um país com os demais. Podemos dizer houve superávit na balança comercial quando:

- a) A balança comercial é desfavorável;
b) As exportações superam as importações;
c) As importações igualam as exportações;
d) As importações superam as exportações.

18) Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) a China, em 2012, possui um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,699. Sabendo que o IDH varia de 0 até 1, podemos dizer que o IDH desse país é:

- a) Elevadíssimo;
b) Elevado;
c) Médio;
d) Baixo.

19) A União Europeia é o bloco econômico mais avançado do mundo sendo, classificado como uma União Econômica e Monetária. Assinale a alternativa que melhor contempla as características desse bloco econômico:

- a) Além de possuir uma área de livre comércio e de livre circulação de capitais, mercadorias, serviços e pessoas, possui uma moeda única;
b) Além de não haver tarifas aduaneiras, contempla uma TEC – Tarifa Externa Comum;

- c) Cerca de 80% do bens comercializados entre as nações do bloco são isentas de tarifas aduaneiras;
- d) Estabelecem tarifas comerciais mais baixas entre os países do bloco do que com os países fora do bloco.

20) A estrutura fundiária corresponde ao modo como as propriedades rurais estão dispersas pelo território e seus respectivos tamanhos, é a forma como o recurso terra se divide em propriedades. Sobre a estrutura fundiária brasileira assinale a alternativa correta:

- a) É bem distribuída;
- b) É altamente concentrada;
- c) Não é concentrada;
- d) É do tipo normal.

ESPECÍFICAS

21) O enfermeiro no centro de material e esterilização desempenha papel importante ao adotar uma postura de observação constante às regras básicas de assepsia e antisepsia. O ácido peracético é uma mistura de peróxido de hidrogênio com ácido acético. Sobre suas particularidades pode se afirmar que:

- a) Na manipulação do produto devem-se utilizar equipamentos de proteção individual, principalmente máscaras com filtros, pois os vapores do ácido peracético são fortemente irritantes;
- b) O ácido peracético é um potente agente microbicida, mesmo quando utilizado em baixas concentrações (0,1% a 0,2%);
- c) Devido sua alta toxicidade, sua degradação não ocorre na presença de água, devendo ser desprezado com empresa adequada;
- d) O ácido peracético deve ser utilizado como última escolha, e se possível substituído por glutaraldeído, uma alternativa muito mais segura.

22) Infecção hospitalar é qualquer infecção adquirida após a admissão do paciente no hospital e que é manifesta durante a internação ou após a alta, quando pode ser relacionada com a internação ou com os procedimentos hospitalares. Entre os tipos mais comuns de infecção hospitalar, é incorreto afirmar:

- a) ITU (infecção do trato urinário): a instrumentação do trato urinário representa o fator de risco mais comum, especialmente a sondagem vesical;
- b) Infecções relacionadas a implantes: ocorrem e uma grande proporção de pacientes, entretanto, sem complicações devastadoras, pois as bactérias se desenvolvem apenas nos biofilmes sem tornarem-se planctônicas;
- c) Pneumonias: fatores como idade, patologia base, instrumentação do trato respiratório, colonização da orofaringe com flora intestinal, predisõem ao aparecimento desse tipo de infecção;
- d) Infecções do sítio cirúrgico: o principal fator predisponente é o potencial de contaminação da cirurgia, bem como as condições pré e pós-operatórias do paciente.

23) O número de portadoras de câncer de mama aumenta a cada dia que passa, mulheres que passaram pela mastectomia apresentam muitos sentimentos fortes e contraditórios que acabam trazendo alterações na vida conjugal e familiar. Sobre a atuação da enfermagem pode-se afirmar:

- a) O profissional da enfermagem atua na terapêutica, diminuindo a dor e explicando o processo de recuperação a paciente;
- b) O enfermeiro pode atuar realizando conscientização da paciente, já que a mesma está impossibilitada de ter uma vida conjugal normal e satisfatória;
- c) De forma objetiva, o profissional da enfermagem realiza as técnicas subordinadas a ele, podendo indicar auxílio psicológico à paciente;
- d) É o profissional de enfermagem que mais tem oportunidade de desenvolver um relacionamento próximo ao sujeito que está sob cuidados, dando destaque a uma visão holística, facilitando o processo educativo e terapêutico com sensibilidade e respeito.

24) A angina é uma síndrome clínica comumente caracterizada por episódios de dor ou pressão na parte anterior do tórax. Tem como causa principal o fluxo sanguíneo coronário insuficiente, resultando em um aporte diminuído de oxigênio para satisfazer a

demanda do miocárdio. Os seguintes cuidados de enfermagem no ataque da dor estão corretos, exceto:

- a) Administrar dieta hiperlipídica;
- b) Verificar SSVV e traçar ECG;
- c) Manter o paciente em repouso;
- d) Administrar medicações de acordo com prescrição.

25) A insuficiência renal aguda caracteriza-se por perda súbita e quase completa da função renal causada pela diminuição da filtração glomerular, resultando em retenção de substância que normalmente seriam eliminadas na urina. É responsabilidade da equipe de enfermagem:

- I. Avaliar frequentemente seu estado, observando e registrando sinais de comprometimento cardíaco, como dispnéia, taquicardia e distensão das veias do pescoço;
 - II. Monitorizar a função renal através do balanço hídrico e da pesagem diária;
 - III. Estar atenta e preparada para situações de emergência que podem ocorrer, como arritmias e parada cardíaca;
 - IV. Manter a família informada a respeito de suas condições, auxiliando-os na compreensão do tratamento;
- a) Apenas I, II e III estão corretas;
 - b) Apenas II, III e IV estão corretas;
 - c) Todas as alternativas estão corretas;
 - d) Apenas a I está correta.

26) A insuficiência respiratória é uma condição caracterizada pela incapacidade do sistema respiratório em fornecer oxigênio necessário para manter o metabolismo, ou quando não consegue eliminar a quantidade suficiente de dióxido de carbono. Em relação à aspiração de secreções das vias aéreas, pode-se afirmar que:

- a) Esse procedimento é simples e pode ser realizado sempre que desejado pelo paciente, independente da espontaneidade da eliminação;
- b) A aspiração deve obedecer à sequência – nasal e oral – evitando o acontecimento de infecção pulmonar por causa da flora bacteriana da boca;
- c) Para o procedimento é necessário apenas sonda de aspiração, gases e luvas;

- d) O período de aspiração deve ser superior a 2 minutos para não causar traumas ao paciente.

27) A doença de Parkinson é um distúrbio neurológico progressivo que afeta os centros cerebrais responsáveis pelo controle e regulação dos movimentos. É correto afirmar sobre a fisiopatologia:

- a) Está baseada na desmielinização dos nervos, após o uso ou contato com organofosfatos;
- b) A fisiopatologia está baseada na lesão resultante da perda de neurônios e na diminuição de um neurotransmissor chamado dopamina, e está associada à bradicinesia, aos tremores e à rigidez;
- c) Caracteriza-se pela atrofia do córtex cerebral, decorrente da ausência de neurotransmissores;
- d) É baseada na insuficiência do suprimento sanguíneo em uma determinada área do cérebro.

28) A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS) significa o conjunto de doenças ocasionadas pela deficiência do sistema imunológico do indivíduo, relacionada com a infecção crônica pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). São fontes de infecção do vírus, exceto:

- a) Suor;
- b) Sangue;
- c) Secreções genitais;
- d) Leite materno.

29) A transmissão do vírus HIV pode ocorrer por transmissão ocupacional, ou seja, acidentes com material perfurocortante infectado pelo HIV, contato com fluidos infectantes, etc. Relacionado à quimioprofilaxia é correto afirmar que:

- a) Pelo fato de a exposição ocupacional não ser um caso de emergência, a quimioprofilaxia pode ser iniciada em um período de 48 horas;
- b) Não é recomendada lavagem exaustiva para exposição percutânea, pois irá lesionar pele sem trazer potencial proteção;
- c) Quando indicada, a duração da quimioprofilaxia é de 6 meses;
- d) Quimioprofilaxia é a terapêutica utilizada para prevenção de aquisição e desenvolvimento

da doença, mediante uso de agente quimioterápico.

30) A eliminação lenta ou ineficaz da bilirrubina resulta em algum grau de icterícia em cerca da metade dos recém-nascidos a termo e 90% dos recém-nascidos prematuros. Na icterícia patológica, o que ocorre com o nível sérico de bilirrubina:

- a) O nível de bilirrubina sérica reduz para 4mg/dl;
- b) O nível sérico de bilirrubina atinge um pico de 10mg/dl;
- c) O nível de bilirrubina sérica se eleva acima de 13mg/dl;
- d) O nível sérico de bilirrubina atinge o máximo em 15 a 25mg/dl entre o 10º e o 15º dia.

31) Devido à quantidade e diversidade de procedimentos realizados diariamente em um hospital, deve-se proporcionar segurança máxima ao paciente contra agentes biológicos. Sobre os fatores de risco da infecção do trato urinário (ITU) relacionados ao cateterismo vesical de demora pode se afirmar, exceto:

- a) Duração do catéter;
- b) Assepsia inadequada/irregular;
- c) Colonização do meato uretral;
- d) Realização de técnica asséptica com povidine.

32) A pouca adesão dos profissionais da área da saúde à prática de lavagem das mãos reflete na maioria das causas de infecção hospitalar e contaminação cruzada. Para que a lavagem das mãos seja eficaz, é necessário utilizar técnica apropriada que permita remover mecanicamente a sujidade, suor, células descamativas e os microorganismos transitórios. Os locais corretos respectivamente de lavagem das mãos são:

- a) Espaços interdigitais, unhas, palmas, punhos e dorso;
- b) Palmas, unhas e punhos;
- c) Palmas, dorso, espaços interdigitais, unhas e punhos;
- d) Dorso, unhas, espaços interdigitais e juntas.

33) O trato gastrointestinal do recém-nascido pré-termo é imaturo em suas funções fisiológicas, quais sejam digestivas, absorptivas e imunológicas. Nesse caso muitas vezes é necessária a sondagem gástrica, como medida para RN é correto afirmar:

- a) É recomendado medir o orifício superior da sonda no ápice do nariz, seguindo até o lóbulo da orelha e, deste, até o início do apêndice xifóide;
- b) Posiciona-se a sonda a partir do ápice do nariz, até o lóbulo da orelha, e, depois, para o ponto médio entre o final do processo xifóide e a cicatriz umbilical;
- c) Deve-se mensurar a partir da boca até ao apêndice xifóide;
- d) É orientado medir a sonda a partir do lóbulo da orelha até o ponto médio do esterno, contando 2 cm abaixo do mesmo.

34) A excreção da urina pode ser dificultada ou impedida completamente devido a algumas alterações no mecanismo excretor da urina, como distúrbios musculares e neurológicos. A sondagem vesical de demora é muitas vezes indicada na Unidade Pediátrica. De acordo com os materiais indicados para o procedimento em crianças, estão corretos, exceto:

- a) Sonda Foley calibre nº 18;
- b) Tubo de xylocaína gel lacrado;
- c) Campo estéril (sendo 1 fenestrado e 1 quadrado);
- d) Coletor de urina estéril (sistema fechado) para crianças.

35) A administração de medicamentos em pediatria requer muita atenção, pois muitas vezes a criança não colabora e sente-se violada. Na administração de medicamentos por via nasal o profissional deve seguir os seguintes procedimentos:

- I. Distribuir os horários respeitando o repouso da criança.
- II. Preparar e orientar os pais ou responsáveis sobre o tipo de medicamento.
- III. Inclinar a cabeça da criança para frente (deitada).
- IV. Instilar a medicação na parte superior da cavidade nasal.

Agora, assinale a alternativa correta:

- a) I, II e IV estão corretas;
- b) I, II, III estão corretas;
- c) II, III e IV estão corretas;
- d) Todas as alternativas estão corretas.

36) A infecção puerperal é uma doença infecciosa localizada nos órgãos genitais, com temperatura oral superior a 38°C, em pelo menos quatro tomadas, entre o 2º e o 10º dias do puerpério, e de persistência por pelo menos dois dias. É um fator de risco obstétrico:

- a) Descuido na hemostasia;
- b) Contaminação do campo operatório;
- c) Ruptura prematura das membranas ovulares;
- d) Deficiência de antissepsia e assepsia.

37) O períneo é a região do corpo humano onde se encontram os genitais e um conjunto de músculos denominados assoalho pélvico. O períneo pode ser traumatizado durante o parto, um dos motivos é:

- a) Sustentar o períneo;
- b) O fato de exercer pressão manual sobre o útero;
- c) Favorecer o parto pela liberação da cabeça;
- d) Suspender o esforço de empurrar no momento da expulsão.

38) O falso trabalho de parto (contrações de Braxton Hicks) refere-se a contrações abdominais sentidas pela gestante ao longo da gravidez e principalmente no oitavo mês. São características dessas contrações, exceto:

- a) São infrequentes;
- b) É mais desconfortável que dolorosa;
- c) Tem intensidade irregular;
- d) Tem intervalos regulares e cada vez mais curtos.

39) As cirurgias podem ser classificadas por potencial de contaminação, pois, os números de microorganismos, presentes no tecido a ser operado, determinarão o potencial de contaminação. Sobre essa classificação é incorreto afirmar que:

- a) Cirurgias limpas: realizadas em tecidos estéreis ou de fácil descontaminação, na ausência de processo infeccioso local, sem penetração nos tratos digestório, respiratório ou urinário;
- b) Infectadas: realizada em tecidos de difícil descontaminação, na ausência de supuração local com penetração nos trato digestório, respiratório e urinário sem contaminação significativa;
- c) Contaminadas: Realizadas em tecidos recentemente traumatizados e abertos, de difícil descontaminação, com processo inflamatório mas sem supuração;
- d) Potencialmente contaminadas: são aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosa ou sem tecidos de difícil descontaminação, na ausência de processo inflamatório.

40) A condição crônica de adoecimento exige que a pessoa faça uma série de adaptações em sua vida, seja nos aspectos fisiológico, psicológico, social. A atuação do profissional de enfermagem é um desafio. Pode-se afirmar que:

- I. O enfermeiro deve estar preparado para orientar o paciente de forma individualizada, pois, cada um reage ao mesmo diagnóstico e fase da doença de formas diferentes;
 - II. O enfermeiro deve explicar ao paciente que sua condição atual é comum e que ele deve aceitar, pois, outras pessoas passam por ela sem sofrer, ser agressivas ou depressivas;
 - III. É necessária a interação entre a equipe multidisciplinar, cliente e família, visando proporcionar-lhes segurança e conforto no decorrer do tratamento;
 - IV. É importante que a equipe de enfermagem, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, dentre outros, mantenha interação necessária para fornecer a terapêutica apropriada ao paciente;
- a) I, III e IV estão corretas;
 - b) II, III e IV estão corretas;
 - c) I, II e IV estão corretas;
 - d) Nenhuma afirmativa está correta.